がんと栄養 がん治療を円滑に行うために

がん患者に対する栄養療法
その必要性と実際

広島市立広島市民病院
NST(栄養サポートチーム)
原野雅生

もくじ

- **NSTとは？**
- **当院でのNST活動**
- **栄養不良；PEM**
- **栄養の実際，各論**
- **悪液質の栄養**

NSTの定義

「栄養管理を症例個々や各疾患治療に応じて適切に実施することをNutrition Support(栄養サポート)といい、この栄養サポートを医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師などの多職種で実践する集団(チーム)をNST(Nutrition Support Team: 栄養サポートチーム)という」

日本栄養療法推進協議会(JGNT)による

理事長 日野原重明

NST: 栄養サポートチーム

歴史: 1970年アメリカ シカゴで開始

栄養不良の患者が多く、合併症・死亡率が高くなることが報告され、また、医療費の増大、在院日数の長期化といった面から、その改善を目的に全米・欧米に80年代急速に広がっていった。

日本のNSTは？

- 1998年頃より、米国を参考に導入
鈴鹿中央総合病院(現 藤田保健衛生大学教授)
東口高志先生に代表される。
- 褥瘡治療の発展した姿として、自然発生的に開始
- 日本静脈経腸栄養学会が中心となり、NST稼働施設の認定を行っている。
- 第三者機関『日本栄養療法推進協議会』のNST施設認定に連動して行っている。

広島市立広島市民病院

日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設：第2回認定

日本栄養療法推進協議会：第1回認定

**日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士認定制度
に基づく 学会認定教育施設**

NSTスタッフ

- コアメンバー

- 医師 6名

- 管理栄養士 4名

- 看護師 5名

- 薬剤師 2名

- 臨床検査技師 1名

- NSTリンクナース 各病棟 1名

ラウンドの様子

当院のNST活動

NST部会 平成16年4月発足

- NSTラウンド 平成16年10月開始
 - 2回/月 4回/月(平成17年10月より)
 - 全科全病棟型
- NST勉強会 1回/月
- NST部会 2回/月

NSTがもたらすもの

NSTの経済(経営)的効用

- 平成18年度診療報酬改定: 栄養管理実施加算(NST加算) 新設

『栄養管理実施加算(1日につき12点)』

広島市民病院では, …

$$120\text{円} \times 700\text{名} \times 30\text{日} \times 12\text{月} = 30240000\text{円}$$

- 適正な栄養療法の導入による治療の完遂, 合併症の減少
経口摂取の改善
経腸栄養の推進
適切な中心・末梢静脈栄養の導入

これまでは、

- それぞれの役割分担をこなす，分業制度

これからは、

• Team医療

複数の職種が参加し、
専門的な知識の集約から、
主治医にアドバイス

がん患者とNST

手術

化学療法，放射線療法

NSTの参加

- 単に栄養状態の改善を目指すのではなく、**治療コンプライアンスの向上こそが、最大の目的。**
- **がん患者に対するEvidenceを持った至適栄養法は明らかではない。**

がん治療期における栄養の必要性

担癌状態

エネルギー消費量の増加

治療による栄養
摂取量の低下

代謝障害

● 低栄養状態

● 治療コンプライアンスの低下

● Cachexia (悪液質)

Protein Energy Malnutrition

PEM: タンパク質・エネルギー栄養不良

タンパク質と、エネルギーの体内バランスが負になる
ことにより生じる

図③——クワシオルコル
アフリカ、ソマリアにて

摂取量の減少
消化器障害による消化吸収障害
体内消費量の亢進
出血や下痢による体成分の喪失

図②——マラスムス
アフリカ、エリトリアにて

院内にみられる栄養不良

某医科大学資料より

Marasmus : 慢性栄養障害

- 筋・脂肪の消失
体重減少・体脂肪喪失の割に、
アルブミン・リンパ球数の低下がみられない。

Kwashiorkor : 急性栄養障害

- 浮腫・腹水が出現
体重・脂肪の損失が軽度の割に、
アルブミン・リンパ球数の
低下が目立つ

実際には、両者の混合型が多い
Marasmus性Kwashiorkor

図③——クワシオルコル
アフリカ、ソマリアにて

PEMの比較

見た目に
わかりやすい

	Marasmus	Kwashiorkor
浮腫	↑	↑
脱毛	→	↑
皮下脂肪・筋肉・体重	↓	→
アルブミン	→	↓
総リンパ球数	→	↓
脂肪肝	なし	あり
遅延型皮内反応	↓	↓
窒素平衡	-	±

血液生化学検査で
わかりにくい

静脈・経腸栄養管理のポイントより

栄養スクリーニングとアセスメント

栄養不良患者の選別とその評価

SGA : Subjective Global Assessment

主観的包括的評価

-問診と身体検査-

- ・体重の変化
- ・食物摂取の変化
- ・消化器症状
- ・身体機能
- ・疾患と栄養必要量の関係

5分もあればほとんどのことが簡単にできる簡単なアンケートだが、血液生化学検査(リンパ球数や、アルブミン)と同様に的確に栄養状態を把握できる有用な栄養評価法

当院でのSGA

SGA of nutritional state (栄養状態の主観的包括的評価) 栄養サポートチーム(NST)

所属	<input type="text"/>	診療科	<input type="text"/>		
加号No.	<input type="text"/>	氏名	<input type="text"/>		
性別 M[1] / F[0]	<input type="text"/>	年齢	<input type="text"/>	ALB値	<input type="text"/>
評価年月日	<input type="text"/>		担当者	<input type="text"/>	

A 病歴

1. 体重の変化

変化	<input type="text"/>	いつから	<input type="text"/>		
現在の体重	<input type="text"/> Kg	健常時体重	<input type="text"/> Kg	体重変化	<input type="text"/> Kg

2. 食物摂取量の変化 (通常との比較)

変化	<input type="text"/>
現在の食事	<input type="text"/>

3. 消化器症状

症状	<input type="text"/>	いつから	(	<input type="text"/>	)
嘔気	<input type="text"/>	いつから	(	<input type="text"/>	)
嘔吐	<input type="text"/>	いつから	(	<input type="text"/>	)
下痢	<input type="text"/>	いつから	(	<input type="text"/>	)
嚥下障害	<input type="text"/>	いつから	(	<input type="text"/>	)

4. 機能性

機能障害	<input type="text"/>
タイプ	<input type="text"/>

当院における血清アルブミン値データ

平成19年3月 Alb検査依頼:1463件

ラウンド対象患者の決定

- 1次抽出 4回/月
 - 入院時栄養管理指導計画書
 - S G A 評価： C , D**
 - **血清Alb値：3.0g/dl以下**
- 2次抽出
 - N S T 医師 2 名（内科・外科）

疾患別ラウンド患者数(名)

平成18年 130名

ラウンド集計結果

ラウンド患者 (11月からの継続患者14名)

	新規患者	継続患者	計
12/1	4名	13名	17名 (終了3名)
12/8	4名 (依頼)	14名	18名 (終了8名)
12/15	5名	11名	16名 (終了5名)
12/22	1名 (依頼)	11名	12名 (終了3名)
延べ			65名

対象患者数 29名

ラウンド提言内容

コメント・反応有

栄養相談(食事内容など)	7件	7件
投与経路(TPNから経口、PPNからTPNなど)	5件	4件
PEG提案	2件	1件
栄養剤・量(ビタミン付加・栄養剤変更など)	8件	6件
その他(原疾患についてなど)	7件	3件
計	29件	21件 (72%)

NST介入終了

(12/1~12/31)

終了理由	
転院・退院	7名
栄養状態改善	5名
ターミナル	2名
PEG挿入	1名
その他	3名
死亡	1名
計	19名

1月への継続患者 10名

栄養委員会資料より

NSTラウンド状況

当院の栄養経路・種類の動向

When the gut works, use it!

- 腸が機能しているときには、
腸を利用すること

TNT テキストより

腸は、栄養の入り口、それだけでなく、

病気の入り口でもある？

体表面積は、大人でも $1.5 \sim 2.0\text{m}^2$
腸の面積は、絨毛により、 600m^2

食事を3日間の絶食で、絨毛の高さが、 $1/3$ に萎縮。
高度の侵襲(手術や、熱傷)で、容易に腸粘膜が破綻。
腸粘膜から、体内へ、細菌や毒素の侵入が始まる。
(Bacterial Translocation)
肝が細菌やEndotoxinのバリアーとなるが、
肝硬変では、容易に破綻し、敗血症へ移行してしまう。

栄養補助食品，薬品

- あくまで，経口摂取が基本
- 機能性食品，医薬品

栄養補助食品，薬品

さまざまな経腸栄養剤，食品，薬品が，各社より販売されているが，最近では機能性食品を謳った製品が多く販売されるようになってきている．**食品であっても，その成分の精度は高く，**薬品に比べて開発費を含めて自由度が高いことから栄養学的にも優れた製品が販売されるようになってきている．**食品であっても，その機能を把握し，使用することが肝要．**

糖質調整流動食：インスロー

成分

- 糖質：パラチノース【グルコース＋フルクトースの還元糖】
- 脂質：しそ油【リノレン酸(ω -3系多価不飽和脂肪酸) 】
＋ひまわり油【オレイン酸】

効能

- パラチノース
消化速度：ショ糖(同じ二糖類)の25%
カロリー：4kcal/g
- リノレン酸
肝での酸化活性亢進により、血清脂質濃度を低下させる
- オレイン酸
2型糖尿病患者のインスリン抵抗性の改善

がん治療期の 栄養

周術期

- ImmunoNutrition 免疫賦活栄養剤

グルタミン

- 免疫力改善
- タンパク質代謝改善

アルギニン

- 成長ホルモン分泌促進

タウリン

- 抗酸化作用
- 細胞膜安定化

Ω3脂肪酸

- 炎症促進物質の抑制

核酸

- 白血球の働きを増強

ビタミンE,C

- 抗酸化作用

がん治療期の 栄養

ImmunoNutrition

✓海外ではインパクトを1000ml/dayを5日間投与した症例で効果を認めたとする報告が多いが、**日本では750ml/dayを5日間**使用する例が多い

✓通常の食事に付加した場合、過栄養から脂肪肝、肝機能障害を合併する症例も経験され、投与方法には工夫が必要

✓味も調整されているが、魚油特有の生臭さなどのために、完遂率が70-80%と報告する施設がある

✓術後の投与では、過剰なアルギニンから誘導されるNO(一酸化窒素)によりSIRSが遷延する**有害事象が報告**されている

がん治療期の 栄養

Glutamine

グルタミン:

- 消化管, 肝・腎, 白血球などのエネルギー源
- 小腸や大腸の粘膜萎縮を防ぎ,
Bacterial Translocationを防ぐ
- 肝では糖新生に基質

グルタミン, ファイバー,
オリゴ糖を含有する食品

がん治療期の 栄養

ビタミンB1 (thiamin)

**目・肩・腰が
つらいと感じたら。**

同じ姿勢で長時間パソコンに集中しすぎて、ふと気がつくと目が疲れ、肩から腰にかけてガチンガチンに固まってしまいました。
アリナミンEXプラスが効く「目・肩・腰のつらい症状」を、柳澤敏郎さんが印象的に演じます。

タケダ薬品ホームページより

がん治療期の 栄養

ビタミンB1 (thiamin)

- **胃切除後**Billroth 法再建 , Roux-en-Y法再建では , 主な吸収部位である十二指腸を通過しないため , **吸収障害**が発生しやすい
- 水溶性であるビタミンB群は , **体内に貯蔵されない**
- **アルコールにより大量に消費**される

チアミン欠乏により引き起こされる疾患

脚気

代謝性アシドーシス(乳酸アシドーシス)

ウェルニッケ脳症 , コルサコフ症候群

多発性神経炎

心不全

がん治療期の 栄養

化学療法剤と 栄養素の関係

化学療法剤	栄養素	機序	効果
5-フルオロウラシル	ビタミンB1	チアミンのリン酸化阻害	心不全ラクトアシドーシス
メトトレキサート、MTX	葉酸	葉酸拮抗物質	葉酸塩欠乏症ホモシスチン血症粘膜炎
イホスファミド	L-カルニチン	L-カルニチン排泄量 (医原性カルニチン欠乏症)	低カルニチン血症疲労(?)脂質異常(?)
インターロイキン2	ビタミンC	代謝性ビタミンC過剰消費 (ビタミンC枯渇)	ビタミンC欠乏症
シスプラチン	L-カルニチン	L-カルニチン排泄量 (医原性カルニチン欠乏症)	低カルニチン血症疲労(?)脂質異常(?)
	マグネシウム	マグネシウム排泄量	低マグネシウム血症 - 血漿Mg量 - 赤血球結合Mg量 低カリウム血症 低カルシウム血症 PTHレベル

がん治療期の
栄養

化学療法剤と 栄養素の関係

フルオロウラシル系化学療法剤では、チアミンのリン酸化を阻害することが報告されており、特に胃切除後では吸収も障害されていることから欠乏症の発症に留意すべきである

がん治療期の 栄養

化学療法と 消化管粘膜障害

- 2007年第43回ASCO

切除不能，再発胃癌に対して，**TS-1 + CDDP併用療法**がTS-1単独療法に比べ生存期間の延長，忍容性に優れると報告

表 癌化学療法における上腹部症状と潰瘍の発生率			
	癌腫と化学療法	上腹部症状の発生率	胃・十二指腸潰瘍の発生率
Sartori S Cancer 1996 ¹⁾ n=182	大腸癌： 5-FU±LV 乳 癌： CMF	31.7%	22.2%
Sartori S JCO 2000 ²⁾ n=228	大腸癌： 5-FU±LV 乳 癌： CMF	32.0%	24.0%
Mori K JCRCO 1995 ³⁾ n=55	非小細胞肺癌： CDDP+VDS	—	75.0%*

*：6個以上のびらん，潰瘍の発生率

1) Sartori S, et al: Cancer 78: 1477-1482, 1996

2) Sartori S, et al: J Clin Oncol 18: 463-467, 2000

3) Mori K, et al: J Cancer Res Clin Oncol 121: 367-370, 1995

図1 消化管粘膜傷害による病態

(Keefe DM, et al: Cancer 109: 820-831, 2007)

がん治療期の 栄養

化学療法と 消化管粘膜障害

図2 胃体部、空腸粘膜傷害への各種H₂ブロッカーの効果(ラット)

胃体部
RGM21

空腸
PGM34

コントロール

5-FU (50mg/kg)

ファモチジン (3mg/kg)

ラフチジン (30mg/kg)

+5-FU

+5-FU

1日1回、5日間経口投与

[三枝陽一ほか: 第93回日本消化器病学会総会(2007)にて発表]

がん治療期の 栄養

化学療法と 消化管粘膜障害

図3 5-FU経口投与が消化管粘液量に与える影響(ラット)

図4 TS-1/CDDP胃粘膜傷害に対するラフチジンの効果(ラット)

がん悪液質の病態

癌組織

エネルギー要求

免疫系異常
サイトカインストーム
IL6, TNF……

代謝
異常

- 体成分異化亢進
- タンパク質合成能低下

脳神経
系異常

- 食欲不振

悪液質

がん緩和医療期 の栄養

点滴すると 癌は育つか？

栄養すると、癌は育つ

過剰な輸液は、胸水、腹水、全身浮腫の原因

ガン細胞は、栄養をいったん取り込むと
放出しない。

健常細胞は飢餓状態にさらされ、
悪液質悪化の原因となる。

適切な投与カロリーについてのエビデンスはない。
健常人で、25-35kcal/kg/dayの投与カロリーに対し、
8割程度の投与を推奨する教科書がある。

輸液についても、1kcal = 1 ml程度

悪液質のコントロール

がん悪液質の病態

癌組織

エネルギー要求

免疫系異常
サイトカインストーム
IL6, TNF.....

代謝
異常

・体成分異化亢進
・タンパク質
合成能低下

脳神経
系異常

・食欲不振

悪液質

ステロイドホルモン

エンドルフィン

?

まとめ

When the gut works, use it!

- **腸が機能しているときには、
腸を利用すること**

TNT テキストより

K-net がん栄養療法

2008.02.15.