卵巣癌の治療

広島市立広島市民病院
産婦人科
野間 純

K-net:2008.7.17

卵巣癌

- 疫学
- 標準治療(初回化学療法)
- 標準治療の限界と今後の展望

癌の罹患率、死亡率

部位別がん罹患率
(女性)
[全年齢 2001年]

資料: 国立がんセンターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

部位別がん死亡率
(女性)
[全年齢 2005年]

資料: 国立がんセンターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

婦人科癌の死亡率

年齢別がん死亡率（乳房・子宮・卵巣 2004年）

資料：国立がんセンターがん対策情報センター

Source: Center for Cancer Control and Information Services, National Cancer Center, Japan

卵巣癌の罹患数・死亡数の推移

年齢別がん罹患数の推移
(女性)
[卵巣 1975年～2001年]

資料: 国立がんセンターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

年齢別がん死亡数の推移
(女性)
[卵巣 1958年～2005年]

資料: 国立がんセンターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

広島県の卵巣癌死亡率は？

都道府県別75歳未満年齢調整死亡率
(女性)
[卵巣 2005年]

資料: 国立がんセンターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

卵巢腫瘍の分類

	良性	境界悪性	悪性
表層上皮性 間質性腫瘍	漿液性嚢胞腺腫 粘液性嚢胞腺腫 類内膜腺腫 明細胞腺腫 ブレナー腫瘍 *	漿液性嚢胞腺腫 粘液性嚢胞腺腫 類内膜腺腫 明細胞腫瘍 ブレナー腫瘍 *	漿液性嚢胞腺癌 粘液性嚢胞腺癌 類内膜腺癌 明細胞癌 悪性ブレナー腫瘍 *
性索間質性 腫瘍	莢膜細胞腫 線維腫 セリトリ間質腫瘍 *	顆粒膜細胞腫 セリトリ間質腫瘍 (中分化) *	線維肉腫 セリトリ間質腫瘍 (低分化) *
胚細胞性腫瘍	成熟奇形腫 卵巢甲状腺腫	未熟奇形腫 (G1,G2) カルチノイド	未熟奇形腫 (G3) 未分化胚細胞腫 卵黄嚢腫瘍 *
その他	腺腫様腫瘍 *	線維芽腫	癌腫 *

卵巣腫瘍

- 卵巣腫瘍の85%は良性
- 卵巣悪性腫瘍の90%は、上皮性
- 卵巣悪性腫瘍の8%は、胚細胞性
- 胚細胞性腫瘍は、10～20歳代の若年に好発

卵巢癌進行期 (FIGO) · 期

a

卵巢癌進行期 (FIGO) · 期

b

卵巢癌進行期 (FIGO)

期

c

卵巢癌進行期 (FIGO) · 期

a

卵巢癌進行期 (FIGO) · 期

b

卵巢癌進行期 (FIGO)

期

C

卵巢癌進行期 (FIGO)

• 期

卵巢癌進行期 (FIGO) · 期

卵巢癌進行期 (FIGO) Ⅳ 期

Silent Cancer

・卵巣の解剖学的特徴

卵巣：骨盤内(腹腔内)にフリーな状態

大きくなっても周囲の臓器を圧迫しない

腹腔内全体に容易に広がる

出血、通過障害などの症状が出にくい

子宮癌のような癌検診の方法がない

卵巢癌・組織別頻度

当科の卵巣癌・進行期別頻度

卵巣癌のRisk factors

Preventive factors

Risk factors

Preventive factors

年齢(高い)

年齢(低い)

家族歴あり

家族歴なし

喫煙(粘液性癌)

コーヒー? 紅茶?

排卵誘発剤、HRT

避妊薬

妊娠・分娩歴がない

35歳以降の分娩

妊娠・授乳

PCO, 子宮内膜症など

肥満

経口避妊薬の使用期間と 卵巣癌の発症

卵巣癌に関連する遺伝子

家族性卵巣癌(<10%): BRCA1, BRCA2 (癌抑制遺伝子) 乳癌
MLH1, MLH2 (DNAミスマッチ修復遺伝子
・HNPCC) 大腸癌

BRCA1...17番染色体、15-40%に卵巣癌が発生

BRCA2...13番染色体、10-20%に卵巣癌が発生

非家族性卵巣癌: p53, p16 (癌抑制遺伝子)

(60-70%)(15%)

HER-2/NEU, k-ras, AKT2, c-myc (癌遺伝子)

(20-30%) (5%) (10%) (20-30%)

遺伝子診断は難しい

まとめ

- 卵巣癌の原因のほとんどは不明
- 卵巣癌は、進行してみつかることが多い
- 女性ホルモン・排卵などに関係しているようだが、予防法も検診の方法も確立していない
- 卵巣癌の罹患数、死亡数ともに増加している

卵巣癌

治療法と成績

卵巣癌の標準治療

a, b期	手術	G1	経過観察
		G2, 3	化学療法 (3-6サイクル)
c期			化学療法 (3-6サイクル)
~ 期		optimal (<1cm)	化学療法6サイクル
		suboptimal (>=1cm)	
		化学療法	
		CR	経過観察
		PR	化学療法
		SD, PD	化学療法
			または緩和医療

IDS: interval debulking surgery

基本的手術手技

基本術式..... 両側付属器切除
子宮摘出
大網切除

Staging laparotomy.....
基本術式
腹腔細胞診
後腹膜リンパ節
(骨盤+傍大動脈)

Debulking surgery.....
腹腔内各所の
播種病変摘出

卵巣癌の化学療法

初回治療

TC療法(以前のTJ療法)

パクリタキセル 175 ~ 180 mg/m² iv(3h)

カルボプラチン AUC 5 ~ 6 iv(1h)

3 ~ 4週間隔で3 ~ 6サイクル

卵巣癌の化学療法

標準的治療の変遷

卵巣癌の5年生存率の推移

化学療法の奏功率

(当科の卵巣癌、期：1992-2001)

	CJ法(41例)	TJ法(34例)
CR	5(33%)	4(21.1%)
PR	8(53.3%)	12(63.2%)
SD	1(6.7%)	2(10.5%)
PD	1(6.7%)	1(5.3%)
RR	86.6%	84.3%

CJ法:cyclophosphamide, carboplatin TJ法:paclitaxel, carboplatin

当科の卵巣癌・進行期別生存率

現在の標準的化学療法 の限界 新たな標準治療は？

組織別化学療法

術前化学療法(NAC)

維持化学療法

腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法

分子標的治療

化学療法の奏功率

(当科の卵巣癌、期;1992-2001)

組織別奏効

	漿液性	明細胞	類内膜	粘液性	その他
CR	6(24%)	2(28.5%)	0	1(100%)	1(50%)
PR	18(72%)	0	1	0	1(50%)
SD		4(57.1%)			
PD	1(4%)	1(14.2%)			
RR	96%	28.5%	100%	100%	100%

当科の卵巣癌 期の組織型

期、期の生存曲線 1996 - 2005年当科

JGOG3017

卵巣明細胞腺癌
(- 期、初回治療)

ランダム化

TC療法群

CPT - P療法群

Paclitaxel: 175mg/m² iv, day1
Carboplatin: AUC6, iv, day1
3週毎に6サイクル

irinotecan: 60mg/m² iv, day1, 8, 15
Cisplatin: 60mg/m², iv, day1
4週毎に6サイクル

現在の標準的化学療法 の限界 新たな標準治療は？

組織別化学療法

術前化学療法(NAC)

維持化学療法

腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法

分子標的治療

術前化学療法 (NAC)

報告者/治療法	生存率		腫瘍縮小手術
Jacob(1991) 標準治療(18) NAC療法(22)	MST 18m 16m(NS)		optimal(<2cm) 39% 77% (p=0.02)
Omnis(1996) 標準治療(284) NAC療法(88)	3year OS 31% 27%(NS)	5year OS 21% 19%(NS)	optimal(<2cm) 29% 42%
Vergote(1998) NAC導入前(112) NAC導入後(173)	3year OS 26% 42%(p=0.0001)		
Kayikcioglu(2001) 標準治療(158) NAC療法(45)	5year OS 24% 30%(NS)	MST 38m 34m(NS)	optimal(=0) 14% 49%(p<0.001)
Kuhn(2001) 標準治療 NAC療法	MST 23m 42m(p<0.007)		optimal(<2cm) 63% 84%(p<0.04)

EORTC-55971

Histologically proven stage I or II ovarian epithelial carcinoma, peritoneal carcinoma, or fallopian tube carcinoma

JGOG-0602

cytologically proven stage c or ovarian epithelial carcinoma,
peritoneal carcinoma,
or fallopian tube carcinoma

現在の標準的化学療法 の限界 新たな標準治療は？

組織別化学療法

術前化学療法(NAC)

維持化学療法

腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法

分子標的治療

維持化学療法

早期癌(Ⅰ、Ⅱ期)の維持化学療法の有用性は示されていない

進行癌(Ⅲ、Ⅳ期)に対する維持化学療法の有用性を示す報告が散見されるが、OSの改善を示すにはいたっていない

進行癌(、)に対する 維持化学療法

SWOG9701, GOG178

臨床的CR症例にPTX

	3 cycle	12 cycle(every 4 weeks)
PFS (中央値)	14m	22m
OS (中央値)	46m	53m (NS)

GOG212

対象は同様

PTX, polyglutamate PTX(12ヶ月), 経過観察

現在の標準的化学療法 の限界 新たな標準治療は？

組織別化学療法

術前化学療法(NAC)

維持化学療法

腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法

分子標的治療

腹腔内化学療法

ポート・カテーテルの留置

* 当科ではカテーテルの先を肝臓のうらに固定している
一般的には、ダグラスに固定することが多い

腹腔内化学療法の大RCT

生存中央値

SWOG8501 /GOG104	P:100mg/m ² iv Cy:600mg/m ² iv 3w, 6 cycle	P:100mg/m ² ip Cy:600mg/m ² iv 3w, 6 cycle	期 残存腫瘍 <=2cm n=546	41m vs 49m p=0.02
GOG114 /SWOG9227	P:75mg/m ² iv T:135mg/m ² iv 3w, 6 cycle	P:100mg/m ² ip T:135mg/m ² iv 3w, 6 cycle C:(AUC 9)iv 4w,2 cycle	期 残存腫瘍 <=1cm n=462	52m vs 63m p=0.05
GOG172	P:75mg/m ² iv T:135mg/m ² iv 3w, 6 cycle	P:100mg/m ² ip T:135mg/m ² iv T:60mg/m ² ip(day8) 3w, 6 cycle	期 残存腫瘍 <=1cm n=415	49m vs 67m p=0.03

腹腔内化学療法

RCT

リスク比

2006 NCI announcement

腹腔内化学療法

7つのランダム化比較試験:

6つの試験でip療法群のOSが勝っていた

症例数の多い米国での試験:

GOG104 GOG114 GOG172

メタアナリシスの結果; 2006年1月にNCIより
アナウンスメント

“**卵巣癌3期症例でoptimalな手術ができた患者には、
腹腔内化学療法を奨励する**”

腹腔内投与された化学療法剤の薬理学的特性

薬剤	分子量	水溶性	腹腔内/血中 薬剤レベル比	
			最高濃度	AUC
シスプラチン	300.05	+	20	12
カルボプラチン	371.25	+	-	18
マイトマイシン	334.33	±	71	-
メルファラン	305.20	-	93	65
メソトレキセート	454.44	-	92	100
5-FU	130.08	±	298	367
ドキソルビシン	543.53	±	474	-
パクリタキセル	853.92	-	-	1000
ミトキサントロン	517.40	-	-	1400

腹腔内化学療法の問題点と今後

- コントロールが現在の標準治療 (TC療法)でない
- carboplatinのIPが少ない
- コントロールと比較するレジメが複雑で結果の判断が難しい

GOGでのRCT??

TC療法(control arm)

VS

ip carboplatin or ip cisplatin or ip paclitaxel
iv paclitaxel
bevacizumab

現在の標準的化学療法 の限界 新たな標準治療は？

組織別化学療法

術前化学療法(NAC)

維持化学療法

腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法

分子標的治療

GOG0182-ICON5

R
A
N
D
O
M
I
Z
E

I Carboplatin AUC 6 (d1)
Paclitaxel 175 mg/m² (d1) **x8**

II Carboplatin AUC 5 (d1)
Paclitaxel 175 mg/m² (d1)
Gemcitabine 800 mg/m² (d1,8) **x8**

III Carboplatin AUC 5 (d1)
Paclitaxel 175 mg/m² (d1)
Doxil 30 mg/m² (d1) **x8**

IV Carboplatin AUC 5 (d3) **x4**
Topotecan 1.25 mg/m² (d1-3)

V Carboplatin AUC 6 (d8) **x4**
Gemcitabine 1 g/m² (d1,8)

Carboplatin AUC 6 (d1)
Paclitaxel 175 mg/m² (d1)

x4

GOG0182-ICON5:全生存率

GOG0182-ICON5:血液毒性

*p<0.001

現在の標準的化学療法 の限界 新たな標準治療は？

組織別化学療法

術前化学療法(NAC)

維持化学療法

腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法

分子標的治療

JGOG3016

Ovarian epithelial , Primary
FIGO Stage -

randomization

Dose-intensity
dose-escalation
dose-dense

Conventional TC

Paclitaxel 180mg/m² day1

Carboplatin AUC 6.0 day1

Every 21 days for 6-9 cycles

Dose-dense weekly TC

Paclitaxel 80mg/m² day1,8,15

Carboplatin AUC 6.0 day1

Every 21 days for 6-9 cycles

JGOG3016

無病生存率

	n	M PFS	P	HR
C-TC	319	17.2mos		
dd-TC	312	28.0mos	0.0015	0.714

生存率

	n	2年生存	P	HR
C-TC	319	77.7%		
dd-TC	312	83.6%	0.0496	0.735

GOG3016

PFSのリスク比

現在の標準的化学療法 の限界 新たな標準治療は？

組織別化学療法

術前化学療法(NAC)

維持化学療法

腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法

分子標的治療

卵巣癌の分子標的治療

EGFR、HER-2/neu : 卵巣癌の予後因子

セツキシマブ(エルピタックス): EGFRのモノクローナル抗体
大腸癌・頭頸部癌

✓ ゲフィチニブ(イレッサ): EGFRチロシンキナーゼ阻害剤
非小細胞肺癌

エルロチニブ(タルセバ): //
非小細胞肺癌

✓ トラスツズマブ(ハーセプチン): 抗HER2抗体
乳癌

GOG170D

プラチナ抵抗性卵巣癌に
Bevacizumab(抗VEGF抗体)単独療法
(15 mg/Kg IV q 3weeks)

CR	3/62	5%
PR	8/62	13%
SD	34/62	55%

Bevacizumabの有害事象

よくある有害事象

下痢

嘔気

鼻血

蛋白尿

高血圧

痛み

重篤な有害事象

GI穿孔

創傷治癒の合併

血栓

腫瘍からの出血

Bevacizumabの消化管穿孔

study	GI perforation(%)
Burger(GOG-170D)	0/62(0)
Garcia(ASCO 2005)	2/29(6.9)
Cannistra(ASCO 2006)	5/44(11.4)
Wright(ASCO 2006)	4/62(6.5)
Friberg(ASCO 2006)	2/13(15.4)
Monk(Gyn Oncol 2006)	1/32(3.1)
Wright(Cancer 2006)	2/23(8.7)
Bidus(Gyn Oncol 2006)	0/3(0)
Penson(ASCO 2006)	0/30(0)
Total	16/298 (5.4%)

GOG218

上皮性
卵巢癌
/
suboptimal

無作為化

PTX; 175mg/m²
CBDCA; AUC=6
q 3weeks x6
Placebo day1x5
Start cycle2

PTX; 175mg/m²
CBDCA; AUC=6
q 3weeks x6
Bevacizumab day1x5
Start cycle2

PTX; 175mg/m²
CBDCA; AUC=6
q 3weeks x6
Bevacizumab day1x5
Start cycle2

Placebo
Day1,
q3weeksx15
cycles

Placebo
Day1,
q3Weeksx15
cycles

Bevacizumab
Day1,
q3Weeksx15
cycles

新たな標準治療は？

まとめ

組織別化学療法
術前化学療法(NAC)

維持化学療法
腹腔内化学療法(IP)

標準化学療法+

dose-denseによる化学療法
分子標的治療

標準的治療の今後

プラチナ前期

GOG47
1980

CAP療法
CPA+ADM+CDDP

有害事象が少ない
心毒性

プラチナ期

GOG52
1989

CP療法
CPA+CDDP

PFS,CRが良好

タキサン期

GOG111、OV10
1996,1998

TP療法
PTX+CDDP

有害事象が少ない
簡便性

GOG158、AGO、Danish-Dutch
1999,1997,1996

TC療法
PTX+CBDCA

組織別化学療法？
明細胞癌

腹腔内投与
分子標的薬*？
Weekly PTX？

*ベバシズマブ、ファレッズマブ
(抗VEGF) (葉酸受容体 の抗体)