



【キイトルーダ＋EC療法について】

(キイトルーダ＋エピルビシン＋エンドキサン)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
アプレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																						
パロノセトロン注	吐き気止めです	15分		1日2錠																				
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回内服																						
キイトルーダ注	抗がん剤です	30分																						
エピルビシン注	抗がん剤です	5分																						
エンドキサン注	抗がん剤です	30分																						

☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
	口内炎																						
	色素沈着																						
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

*キイトルーダ注の副作用につきましては別紙を用いてご説明します。

*注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。

*上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

*それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

*何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。