



【mFOLFOX+アービタックス療法について】
(5-FU+レボホリナート+エルプラット+アービタック)



様



コース目

😊 お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
パロノセトロン注	吐き気止めとアレルギー様症状を抑える薬です	15分	点滴														点滴													点滴	
デキサート注	アレルギー様症状を抑える薬です	15分							点滴																					点滴	
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	点滴						点滴								点滴													点滴	
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です	2時間	点滴																											点滴	
5-FU注	抗がん剤です	約5分	点滴																												点滴
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	点滴	点滴														点滴	点滴												点滴

*前立腺肥大症や閉塞隅角線内障がある方はお知らせください。

😊 治療による副作用

自覚症状	検査値	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
アレルギー様症状									■																					■				
食欲不振・吐き気			■	■	■													■	■	■										■				
口内炎					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
手足のしびれ			■																												■			
色素沈着																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
皮膚症状(皮疹、乾燥、爪団炎など)																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
白血球減少																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
赤血球減少(貧血)																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
血小板減少																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

