



【アービタックス+ピラフトビ+FOLFOX療法について】
(アービタックス+ピラフトビ5-FU+レボホリナート+エルブラット)



様

コース目

😊 お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
パロノセトロン注	吐き気止めです	30分															
ボラミン注	過敏症を抑えるお薬です																
デキサート注																	
アービタックス注	抗がん剤です	120分															
エルブラット注	抗がん剤です	2時間															
レボホリナート注	5-FUの効果を高めるお薬です																
5-FU注	抗がん剤です	5分															
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間															
ピラフトビカプセル	抗がん剤です	1日1回 内服															

○ピラフトビカプセル (1日1回、1回 カプセル)

*前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目
自覚症状	過敏症															
	食欲不振・吐き気															
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)															
	口内炎															
	手足のしびれ															
	眼障害															
	手足症候群															
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)															
検査値	白血球減少															
	赤血球減少(貧血)															
	血小板減少															
	肝機能障害															

- 腫瘍崩壊症候群(尿量が減る、息苦しさ、息切れ、意識の低下等)
- 出血
- 皮膚悪性腫瘍(いぼができる、皮膚の表面がただれたりじゅくじゅくする)

広島市民病院薬剤部



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。
- * 抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。