




【weekly パクリタキセル療法について】



様



コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
ポララミン	過敏症を抑えるお薬です																														
ファモチジン注 デキサート注	30分																														
パクリタキセル注	抗がん剤です	1時間																													

前立腺肥大症や閉塞隅角線内障がある方はお知らせください。

治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
過敏症																													
食欲不振・吐き気																													
筋肉痛・関節痛																													
口内炎																													
手足のしびれ																													
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
白血球減少																													
赤血球減少(貧血)																													
血小板減少																													
肝機能低下																													



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものですが、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。
- * 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。

広島市民病院薬剤部