



【IsaPd療法について】

(サークリサナポマリスト+デカドロン)



様



コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
カルナール錠	アレルギー予防	1日1回 内服	○	1回 錠						○						○							○							○	
デキサート注	抗がん剤です (ステロイド)										○						○						○							○	
ファモチジン注 ポララミン注	アレルギー予防	30分	○							○						○							○							○	
サークリサ注	抗がん剤です	3-4時間	○							○						○							○							○	
ポマリスト カプセル	抗がん剤です	1日1回 内服	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

*2コース目以降は2週間毎の投与になります。

*前立腺肥大症や閉塞隅角線内障がある方はお知らせください。

治療による副作用

自覚症状	アレルギー様症状	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
	食欲不振・吐き気																													
	下痢																													
	末梢神経障害																													
	白血球減少																													
	赤血球減少(貧血)																													
	血小板減少																													
	肝機能低下																													

以下の副作用は、気づいたことがあればお知らせください。

- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものですが、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。