




【Mosun-Pola療法について】

(ルンスミオ+ポライビー)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目			
薬の名前	作用	めやすの時間																									
レスタミン 錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服		レスタミン、カロナールは投与がない場合があります。																							
カロナール錠		1日1回 内服																									
ポライビー注	抗がん剤です	30分										この週はお休みです。								この週はお休みです。							
ルンスミオ注	抗がん剤です	数分																									

* 前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障がある方はお知らせください。

★ 治療日の1～2日前は、十分な水分摂取(1～2L目安)をしてください。

😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																							
	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																							
	サイトカイン放出症候群																							
	発熱、倦怠感、吐き気、脱力感、めまい、ふらつき、呼吸が苦しいなどの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合はすぐにお知らせ下さい。																							
	神経学的事象																							
		力が入らない、言葉が出ない、ふるえ、けいれん、ねむけ、意識低下などの症状があらわれることがあります。																						
手足のしびれ																								
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																							
検査値	白血球減少																							
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心しましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)																							
	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																							
	血小板減少																							
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																						
肝機能低下																								
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																							



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 抗がん剤投与および投与後一定期間は適切な避妊を行ってください。
- * 自動車運転等を行わないよう注意が必要です。主治医の指示に従ってください。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部