



## 【カルボプラチナ+アブロキサン療法について】



様

--

コース目

..  
お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			1日1回内服	○	○	○																		
アブレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回内服	○	○	○																			
デキサート注	吐き気止めです	30分																						
グラニセトロン注	吐き気止めです																							
アブロキサン注	抗がん剤です	30分																						
カルボプラチナ注	抗がん剤です	1時間																						

..  
治療による副作用

: 注意が必要な時期

自覚症状	過敏症	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
	食欲不振・吐き気																						
	筋肉痛・関節痛																						
	口内炎																						
	手足のしびれ																						
	便秘																						
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						
	肝機能低下																						



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。

\* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。

\* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

\* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

広島市民病院薬剤部

